



CSK UM w ŁODZI

Informacja dla pacjenta Zakład Medycyny Nuklearnej

Scyntygrafia ektopowej błony śluzowej żołądka

opracował	Lek. Aleksandra Aulich Lekarz – Zakład Medycyny Nuklearnej
zatwierdził	prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski - Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej

Cel badania:

Badanie pozwala na wykrycie i lokalizację ektopowej błony śluzowej w anomaliach rozwojowych przewodu pokarmowego (w uchyłku Meckela i zdwojeniach układu pokarmowego).

Przed wykonaniem badania każda pacjentka w wieku rozrodczym zostanie poproszona o odpowiedź na pytania, czy jest w ciąży lub czy karmi piersią.

Jeżeli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży powinna poinformować o tym fakcie lekarza kwalifikującego na badanie. W przypadku kobiet ciężarnych decyzja o przeprowadzeniu badania będzie podejmowana indywidualnie. W przypadku kobiet karmiących piersią wskazana jest konsultacja z lekarzem naszej placówki, w celu zaplanowania przerwy w karmieniu.

Przygotowanie do badania:

- Przed badaniem należy pozostać na czczo.
- Przed badaniem należy odstawić leki mogące mieć wpływ na interpretację badania – przy umawianiu terminu badania pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.
- W przypadku pacjentów niesamodzielných konieczne jest zapewnienie opieki przez osobę towarzyszącą.

Przebieg badania:

Pacjent zostanie ułożony na plecach pod aparaturą pomiarową (gamma kamerą), następnie zostanie podana dożylnie niewielka ilość znacznika promieniotwórczego (radiofarmaceutyku). Badanie scyntygraficzne będzie trwało ok. 30 minut. W razie potrzeby zostanie wykonane dodatkowe badanie tomograficzne trwające ok. 20 minut.

Zalecenia po badaniu:

- Po badaniu, do końca dnia, zaleca się picie większej niż zwykle ilości płynów oraz częste korzystanie z toalety w celu szybszego wydalania radiofarmaceutyku.
- W związku ze stosowaniem izotopów promieniotwórczych w dniu badania zaleca się unikanie kontaktów z kobietami w ciąży i małymi dziećmi.

Łączny czas pobytu w Zakładzie wynosi ok. 2-3 godzin.